

## PROSPECTO



**Acetaminophen**

**Dosing Chart**

**Cuadro de dosificación**

Infants' concentrated drops  
80 mg/0.8 ml

Gotas concentradas para bebés  
80 mg/0.8 ml




Yes/Sí No

Children's suspension liquid and elixir  
160 mg/ 5 ml

Suspensión líquida y elixir para niños  
160 mg/5ml




Yes/Sí No


Children's chewable tablets  
80 mg each

Tabletas masticables para niños  
80 mg cada una




Junior Strength chewable tablets  
160 mg each

Tabletas masticables Junior Strength  
160 mg cada una

Dose/Dosis		Dropperful/ Gotero lleno	Teaspoon/ Cucharadita	Tablet/ Tableta	Tablet/ Tableta
Weight/Peso	Age				
Under 24 lbs	Under 2 yrs/años	Consult Your Child's Doctor / Consulte al médico del niño			
24-35 lbs	2-3 yrs/años	2 (0.8 + 0.8 mL)	1	2	
36-47 lbs	4-5 yrs/años		1-1/2	3	
48-59 lbs	6-8 yrs/años		2	4	2
60-71 lbs	9-10 yrs/años		2-1/2	5	2-1/2
72-95 lbs	11 yrs/años		3	6	3
96 lbs & over 96 lbs o más	12 yrs/años				4

**Usese sólo según las indicaciones.**

**NOTA:** Si es posible, bájese en el peso para dosificar; si no, bájese en la edad. Para determinar la dosis correcta, pese al niño antes de darle TYLENOL®. Todas las dosis pueden repetirse cada 4 horas, pero no más de 5 veces al día. Consulte a un profesional de la salud para obtener información sobre las dosis para niños menores de dos años.

**ADVERTENCIAS:**

- Children's TYLENOL® no debe tomarse para el dolor por más de 5 días o para la fiebre por más de 3 días, a menos que el médico lo indique. Si persiste o empeora el dolor o la fiebre, si aparecen nuevos síntomas o si se presenta hinchazón o enrojecimiento, debe consultarse al médico porque éstos pueden ser síntomas de algo más serio.
- **No se debe exceder la dosis recomendada.** Tomar una cantidad mayor que la dosis recomendada (sobredosis) puede no brindar alivio adicional y podría causar daños serios a la salud. Mantenga ésta y todas las medicinas fuera del alcance de los niños. En caso de una sobredosis accidental, llame inmediatamente al médico o a un centro de control de envenenamiento. La atención médica inmediata es crítica incluso si no nota ningún síntoma o signo.
- No use esta medicina junto con ningún otro producto que contenga acetaminofén.
- No administre los productos Extra Fuerte TYLENOL® para Adultos a niños menores de 12 años.

Si tiene preguntas o comentarios, llame al 1-800-962-5357,  
o bien pregúntele a su médico, farmacéutico o profesional de la salud.



McNeil Consumer Healthcare  
DIVISION OF MCNEIL-PPC, INC.  
FORT WASHINGTON, PA 19034 USA  
© MCN-PPC, Inc. '00

7627541



Use Only As Directed. Usese sólo según las indicaciones.